

ЕСЛИ ВЫ СТАРШЕ 65 ЛЕТ, ТО ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ РИСКА ОСЛОЖНЕНИЙ И НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА ГРИППА

- ❖ Грипп и острые респираторные инфекции (ОРИ) ежегодно занимают первое место по распространенности и составляют до 90% от всех инфекционных заболеваний в каждой стране мира, в т.ч. и в нашей стране, и в нашем городе.
- ❖ До 50 человек из 100 не привитых каждый год заболевают гриппом и ОРИ.
- ❖ Имеются данные о том, что грипп приводит к обострению хронических сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению инфаркта, инсульта.
- ❖ Каждая вторая госпитализация, связанная с гриппом и ОРИ приходится на лиц 65 лет и старше.
- ❖ Пожилые люди находятся в группе риска по смертельному исходу от гриппа.

ВЫ МОЖЕТЕ УЙТИ ИЗ ЗОНЫ РИСКА, СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!

Почему лица пожилого возраста попадают в зону риска заболевания гриппом с неблагоприятными последствиями?



С возрастом иммунная система человека ослабевает, становится не способной адекватно справляться с возбудителями инфекционных заболеваний. Снижается приобретенный в течение жизни иммунитет к инфекциям. К этому периоду жизни у многих «накапливаются» хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы (ИБС, гипертония), органов дыхания (хронический бронхит, бронхиальная астма), почек (пиелонефрит), эндокринной системы (сахарный диабет) и т.д. Все эти факторы повышают риск тяжелого течения гриппа у лиц 65 лет и старше.

Какие осложнения и неблагоприятные последствия после гриппа отмечаются у лиц пожилого возраста?

Наиболее частыми осложнениями и неблагоприятными последствиями являются:

- ❖ **Пневмония** (воспаление легких) и **бронхит** (воспаление бронхов). У пожилых людей грипп в 2 раза чаще осложняется пневмонией.
- ❖ **Инфаркт, инсульт, обострение и утяжеление течения имеющихся хронических заболеваний.**
- ❖ **Осложнения со стороны ЛОР-органов:** воспаление уха (отиты), воспаление пазух (гаймориты, синуситы).
- ❖ **Осложнения со стороны внутренних органов:** воспаление почек и мочевого пузыря (пиелонефриты, циститы), воспаление желчных путей (холангиты).

Вирус гриппа приводит к тому, что все органы работают «в напряжении». Работа здоровых органов через несколько месяцев после гриппа восстанавливается. А вот работа органов, которые до возникновения гриппа были поражены, может не восстановиться. Пожилой человек с ишемической болезнью сердца после гриппа может попасть в больницу с инфарктом, а пациент с гипертонической болезнью, даже на фоне приема эффективных препаратов – может погибнуть от инсульта.

Как можно защититься от гриппа?

Защищаться от гриппа можно с помощью вакцины, противогриппозных лекарственных препаратов и народных средств.

Самая эффективная защита против гриппа – та, которая создана с помощью вакцин:



- ❖ в 2-5 раз эффективнее защиты, сформированной с помощью лекарственных препаратов и народных средств.
- ❖ является специфичной к вирусам гриппа, которые будут циркулировать именно в этом сезоне.

Вакцинация против гриппа:

- ❖ снижает риск возникновения гриппа и ОРИ;
- ❖ устраняет риск осложнений и смертельного исхода;
- ❖ предотвращает возможность заражения гриппом членов семьи, детей и внуков.

Какие вакцины используются для прививок против гриппа?

Для проведения прививки Вам предложат противогриппозные вакцины, зарегистрированные Министерством здравоохранения Республики Беларусь и рекомендованные для применения у лиц 65 лет и старше. Длительный опыт применения этих вакцин в нашей стране и за рубежом доказал их высокую эффективность и безопасность.

Насколько эффективны прививки против гриппа у пожилых лиц?

Результаты многолетних исследований в различных странах мира (Италия, Германия, Испания, Англия и др.) показали, что среди привитых пожилых лиц по сравнению с не привитыми отмечается:

- ❖ Снижение на треть количества госпитализаций, связанных с гриппом и пневмонией.
- ❖ Снижение риска инфаркта на фоне ишемической болезни сердца.
- ❖ Снижение риска инсульта на фоне гипертонической болезни.
- ❖ Облегчение тяжести течения гриппа и ОРИ.

Как пожилые люди переносят прививки против гриппа?

Прививки для профилактики гриппа переносятся хорошо. В отдельных случаях у пожилых лиц после введения противогриппозных вакцин могут возникнуть местные и общие реакции.

- ❖ Местные реакции – покраснение, болезненность, уплотнение в месте инъекции – могут возникнуть не более чем у 6-14 человек из 100 привитых.
- ❖ Общие реакции в виде повышения температуры до 37,5°C, озноба, недомогания встречаются не более чем у 1-15 человек из 100 привитых.

Эти реакции, как правило, не требуют медикаментозного лечения, проходят самостоятельно в течение 1-3 суток, не влияя на общее состояние организма.

Когда лучше всего делать прививку против гриппа?

Оптимальным сроком проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь.

Нужна ли специальная подготовка к прививке тем, у кого есть хроническое заболевание?

Нет, не нужна. Прививка проводится на фоне проводимого лечения вне стадии обострения хронического заболевания. Перед вакцинацией Вас осмотрит врач и решит вопрос о возможности проведения прививки.

Дорогие бабушка и дедушка!
Мы Вас очень любим.
Вы нам очень нужны.
Оставайтесь с нами рядом долго-долго.
Позаботьтесь о своем здоровье!
Не забудьте сходить в поликлинику
и сделать прививку против гриппа.
Ваши внуки.



5

Авторы: Волосарь Л.А., врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения;
Колосюк Н.В., зав. противоэпидемическим отделением

Редактор: Палазник И.А.

Компьютерная верстка и оформление: Ю.О. Макеев.

Ответственный за выпуск: С.В. Кавриго

Комитет по здравоохранению Мингорисполкома
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»
Городской Центр здоровья

ОСТОРОЖНО ГРИПП!



МИНСК